

Édition Octobre 2025





VERS UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS FORMULES ET DE NOS EMBALLAGES



Introduction du

1970

Lancement de la première formule de nutrition par sonde Nutrison® prête à l'emploi

1990-2000

Introduction du mélange unique de 6 fibres mf6 : Agit sur la flore intestinale, l'immunité et la tolérance gastro-intestinale^{1,2}. Introduction d'un mélange unique de caroténoïdes, pour le stress oxydatif4.

non-coaqulantes p4 avec lactosérum. caséine, pois et soja pour réduire les intolérances digestives hautes4. Ajout d'EPA et de DHA, des nutriments anti-inflammatoires essentiels1.

mélange de protéines

2018

Lancement de l'emballage OpTri. Concu pour améliorer la sécurité, l'hygiène, l'expérience utilisateur et être majoritairement recyclable. Réduction de 85 % de la consommation d'eau

et 21 % de CO² en

moins*.

notre cœur de gamme **Nutrison 1.0 & Nutrison** Energy reflétant les dernières avancées scientifiques, les recommandations nutritionnelles et un nouveau pas vers une gamme de produits plus durable avec une réduction de notre empreinte carbone allant jusqu'à -23 % selon le produit**.

Reformulation de

NUTRICIA Nutrison

PRINCIPAUX BÉNÉFICES NUTRITIONNELS



TRÈS BONNE TOLÉRANCE DIGESTIVE

- Protéines qui ne coagulent pas dans l'estomac et vidange gastrique⁵ plus rapide. L'étude clinique effectuée avec Nutrison 1.0 et Nutrison Energy reformulés, a démontré que les patients n'ont aucun ou très peu de symptômes gastro-intestinaux⁵.
- Mélange unique de fibre mf6° pour favoriser la tolérance gastro-intestinale et améliorer la composition du microbiote intestinal⁶.



SOUTIEN DE LA FONCTION MUSCULAIRE

- Haute digestibilité des protéines de soja, pois, de caséines et de lactosérum⁸.
- Effet anabolique comparable aux protéines laitières8.
- Mélange protéique de haute qualité⁹ : score de digestibilité des acides aminés essentiels PDCAAS >1.0 et est riche en acides aminés (arginine, glycine), avec un profil équilibré.



SOUTIEN DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

- Vitamines D, B et C pour aider à prévenir les carences et pour soutenir la fonction immunitaire¹⁰.
- Un mélange unique de caroténoïdes pour lutter contre le stress oxydatif et prévenir les carences1.
- Des acides gras oméga-3 avec DHA et EPA pour réguler le statut plasmatique et réduire l'inflammation1.
- Des prébiotiques inuline et fructo-oligosaccharides pour renforcer le microbiote intestinal^{2,11}

REFORMULATION EN 2025 DE NUTRISON 1.0 & ENERGY 500 mL ET 1000 mL













* Par rapport à l'ancien process de production des anciennes poches de nutrition entérale Nutrison®. **L'empreinte carbone des deux gammes a été mesurée conformément à la norme internationale reconnue ISO

"Temprente carbone des deux gammes a ete mesuree conformement a la norme internationale reconnue ISO 14067, vérifie et certifié par Carbon Trust en 2024, pour différentes tailles d'emballage.

1. Jakobsen LH, et al. Clin Nutr. 2017; 36(2):380-88. 2. Guimber D, et al. Br J Nutr. 2010; 104:1514-22. 3. Vaisman N, et al. Clin Nutr. 2006; 25(6):897-905. 4. Goelen et al., Clin Nutr. 2021; 40(5):2663-72. 5. Van den Berg C et al. ESPEN Accepted Abstract, Clin Nutr. 2024 6. Wiedersma NJ, et al. Ned Tijdschr Voeding Diet. 2001; 56(11):243-247.

7. Maughan PJ, ET AL. J Nutr. 2005; 135(3):404-409. 8. Hofman Z, et al. ESPEN Accepted abstract. Clin Nutr. 2024.

FAO. Report on FAO expert consultation. 2013. 9. Berger, MM et al. Clin Nutr. 2022: 41 (6), 1357-1424. 10. Schneider SM, et al. Clin Nutr. 2006; 25:82-90.

PRODUITS





PACKAGING

OpTri

PRATICITÉ SÉCURITÉ PLANÈTE



(NUT RICIA

VOUS ACC OMPAGNE
DANS LA PRIS E EN CHARGE
NUTRITION NELLE DE
VOS PATI ENTS EN
NUTRITION ENTÉRALE

PARTENAIRE



Formation



Service



Études



Retour

POMPE

FLOCARF® INFINITY™ III



Les produits de la gamme Nutrison sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. À utiliser sous contrôle médical.

Pompe Flocare Infinity : Dispositif médical de classe IIa – Marquage CE 0344. Lire la notice d'instruction avant utilisation.

^{*} DHA : acide docosahexaénoïque - EPA : acide eicosapentaénoïque.

LA GAMME

Nutrison 1.0 Nutrison Energy Nutrison Protein Plus Energy Nutrison Concentrated 2.0 Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre Nutrison Nutrison Advanced Advanced Cubison Peptisorb Nutrison Peptisorb Plus HEHP Nutrison Protein Intense

NUTRISON														
		NORMOÉNERGÉTIQUE		HYPERÉNERGÉTIQUE		HYPERPROTIDIQUE-		CONCENTRÉ HYPERÉNERGÉTIQUE		RGÉTIQUE	UE SPÉCIFIQUES			
						HYPERENE	RGÉTIQUE	NORMOP	ROTIDIQUE	HYPERPROTIDIQUE	Cicatrisation	Malabsorption s	emi-élémentaire	I beremetalisee
		sans fibres	avec fibres	sans fibres	avec fibres	sans fibres	avec fibres	sans fibres	avec fibres	avec fibres	des escarres	NENP hypolipidique	HEHP	Hyperprotidique
		Pour 5	00 ml	Pour 5	00 ml	Pour 5	00 ml	Pour	500 ml	Pour 500 ml	Pour 500 ml	Pour 500 ml	Pour 500 ml	Pour 500 ml
ÉNERGIE	kcal	500	515	750	765	750	765	1000	1000	1000	520	500	750	630
PROTÉINES	g (% AET)	20 (16)	30	(16)	37,5	(20)	37,	5 (15)	50 (20)	27,5 (22)	20 (16)	37,5 (20)	50 (32)
Azote	g	3,	2	5			,0		5,0	8,0	5,0	3,2	6,0	8,0
Arginine totale	g	1,4	4	2,0	07	2,0	1,8	2,0	1,65	4,04	4,3	0,5	1,06	2,6
Ratio cal/azote®	kcal/g d'N	156	161	150	153	100	102	142	167	125	82	125	100	54
LIPIDES	g (% AET)	19,5 (35)		29 (35)		29 (35)	29 (34)	50 (45)	48,5 (44)	46,5 (42)	17 (28)	8,5 (15)	25 (30)	25 (35)
Acides gras saturés	g	2,	4	3	5		,5	13	12,5	11	6,0	5,0	18,0	7
dont TCM	gg	- 11	1	1	6		,5 6	8,5 29	8,0 27,5	7,0 25,5	4,5 7,0	4,2 1,0	15,0 3,1	3,45 13
Acides gras mono-ins		6,		9		5,5	5,0	8,5	8,0	10	3,5	2,5	4,15	4,8
Acides gras poly-insat EPA	mg mg	98	101	98	101	151	152	150	261.5	175		-	2,5	150
DHA	mg	67	69	67,5	69,5		03	102	175	274,5	_	-	0,5	105
AA	mg	7,6	7,85	7,6	7,9		0	10	20	12,6	-	-	8.95	0.20
ω6/ω3		4,		4,		2	,8	2,9	2,65	3,18	5,3	8,3	5,16	2,9
ω3	mg	1106	1112	1587	1598	1242	1212		905	2124	535	251	493,75	1105
GLUCIDES	g (% AET)	62 (,	92 (49)	92 (48)	85 (45)	85 (44)	101 (40)	100,5 (40)	92,5 (37)	63 (47)	89 (69)	93,5 (50)	50 (33)
Mono/disaccharides	g	4,1	4,4	6,0	13	17	29	26,5	7,0	6,5	5,0	5,5	7,0	4,0
Polysaccharides	g - (0/ AFT)	56	55	84	77	67	56	93	91	84	55	76	85	47
FIBRES MINÉRAUX		<0,5 (0)	7,5 (2,9)	<0,5 (0)	7,5 (2)	0 (0)	7,5 (2)	<0,50 (0)	7,5 (1,0)	7,5 (1)	7,5 (3)	0 (0)	< 2,5 (0)	0,45 (0)
Sodium	mg	45	Λ	67	75	500	440	500	615	700	500	495	985	580
Potassium	mg	75		10		770	845	900	1335	1875	750	750	1700	1090
Chlorures	mg	60		50		300	285	400	555	1200	625	665	300	480
Calcium	mg	40	0	60	00	420	335	400	740	740	400	401	486	375
Phosphore	mg	30	0	45	50	420	310	380	520	570	360	350	485	410
Magnésium	mg	105	104	15		150	75	175	200	208,5	115	115	150	110
Fer	mg	8,		1		12	13	16	16,05	10,65	8,0	7,9	11,65	10
Zinc	mg	5,		7			,0	12	8,3	8,15	10	5,8	8,5	7,5
Cuivre	mg	0,7		1			,4	1,8	1,65	1,05	1,0	0,90	1,25	1,1
Manganèse	mg	0,7		1,		0,75	,5 0,60	3,3	1,0	1,0 1,25	1,9 0.50	0.50	1,8 0,70	1,75 0.65
Fluor	mg µg	55		82			5		00	94	50	55	84,5	65
Molybdène Sélénium	PE PE	29		4	,-		3	55	54,5	60	48	29	47	34
Chrome	ha ha	30		4			i0		65	41,85	34	33	47,65	42
lode	hB	70		10		100	110		35	134	65	65	92,5	95
ANTI-OXYDANTS VÉGÉTA	.UX mg	1,0	0	1,	5	1,	,5	2	2,0	2,0	1,2	0,80	1,5	1,0
α-carotène	рg	200		30	- , -		45	460	401	401	265	211	390,5	265
β-carotène	ha	31		47			45	860	630	630	495	331	615	415
γ-carotène	ha	1,9		2,8			,0	4,0	3,8	3,8	2,3	2,0	3,7	2,5
Lycopène	ha	181		27			00	400	363	363	230	190 74	353	240
Lutéine	LIG Hg	70 0,9		10			05 ,5	270 2,0	141	141 1,9	155 1,2	1,0	137,5 1,85	95 1,3
Zéaxantine VITAMINES	ЬB	0,5		1,4	i.		,u	۷,0	1,9	1,9	1,2	1,0	1,00	ال,ا
A	ЬВ	41	0	6	15	6	15	8	20	500	410	409	615	510
D	ha	8,			,8		0	14	13,3	13,3	3,5	3,5	10	8,5
E	mg E-α-T	6,		9			,5	13	18	17,05	38	6,3	9,7	8,0
K	ha	40		6			0		55	50	27	27	40,5	33
B1	mg	1,0		1,			,2	1,5	6,5	0,9	0,75	0,75	1,1	1,0
B2	mg	1,5		2			,2		1,6	1,2	0,95	0,80	1,3	1,5
Niacine	mg (mg EN)	4,7 ((13,6)	4,9 (14)	4,4 (14)	9,5 (18)	8,25 (17,95)	3,8 (13,8)	3,55 (9,0)	4,2 (9,0)	0,55 (14,75)	- (12)
Ac. pantothénique	mg	2,		3 2			,0 ,3		5,5 1.7	3,8 1,2	2,7	2,7 0,85	4,0	3,3 1,1
B6 Ac. folique	mg µg	12		18			,3	265	242,5	189	1,0 150	135	1,3 150	165
B12	hā hē	2,1		3.		1,6	2,7		2,7	2,85	1,2	2,0	3,2	2,6
Biotine	P6 Pg	15		22			10		40	30	20	20	30	25
C	mg	6		97	,-		5		00	73,5	190	50	75	65
Choline	mg	18		27			75	365	367	367	185	184	277,5	230
Taurine	mg	-					-		-	100	-	-	50	-
OSMOLARITÉ	mOsm/l	27		400	480	350	390	410	520	540	315	455	455	275
Teneur en eau	g	425	420	390	380	385	380	3	50	350	415	420	385	405

Pour de plus amples informations sur nos produits, merci de vous référer à nos fiches posologiques, à notre site internet ou aux étiquettes.

 $(1) \ Ratio\ calories\ non\ prot\'eiques\ (kcal)\ /\ azote\ (g).\ Les\ calories\ li\'ees\ aux\ fibres\ sont\ prises\ en\ compte\ dans\ le\ calcul.$

Tous les produits sont disponibles au format bouteille Optri.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour les besoins nutritionnels en cas de déuntrition associée à une maladie. À utiliser sous contrôle médical.

1250

chercheurs dans le groupe Danone

Quelques chiffres clés

1250 chercheurs du groupe Danone dont 200 travaillent exclusivement au sein de la recherche NUTRICIA sur des thématiques telles que la physiologie, l'immunologie, la biologie intestinale, l'analyse sensorielle, le métabolisme musculaire, la neurologie, etc.


- → Plus de **500 collaborations** scientifiques, cliniques et industrielles dans le monde.
- → Les produits des gammes NUTRICIA sont distribués dans 74 pays.
- → 6 centres de recherche spécialisée : aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Brésil, à Singapour et en Chine.



Nutrison, une composition étudiée pour alimenter au mieux vos patients

Profil lipidique recommandé pour la population générale¹

- \rightarrow Ratio ω6/ω3 < 5 Ratio ω6/ω3 Nutrison < 3,1
- → EPA + DHA*: apport recommandé de 500 mg/jour 1,5 l** de Nutrison apporte 500 mg*** d'EPA + DHA
- Acides gras saturés : apport recommandé inférieur à 12 % des AET' Nutrison apporte 9 % des AET sous forme d'acides gras saturés




- Des mélanges de protéines formulés pour ne pas coaguler dans l'estomac⁴⁻⁶.
- Les seules formules avec 4 types complémentaires de protéines (lactosérum, caséines, soja, pois) pour être plus proches d'une alimentation équilibrée telle

que préconisée par le PNNS⁷.



Un complexe d'anti-oxydants végétaux pour réduire significativement le stress oxydatif



- Augmentation significative de la teneur sérique en caroténoïdes chez les patients en nutrition entérale au long cours²
- 30 % de réduction des bio-marqueurs du stress oxydatif²




Un mélange de 6 fibres pour agir sur la tolérance digestive basse

- Des fibres solubles : oligo-fructose, inuline et gomme arabique
- Des fibres insolubles : polysaccharides de soja, amidon résistant et cellulose
- Une activité prébiotique démontrée^{8,9}
- Des ballonnements diminués¹¹
- Un transit régulé^{3,10,11}
- $1. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras [Internet]. ANSES; 2011 Retrieved from: \\ https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2006sa0359Ra.pdf.$
- Vaisman N, et al. Enteral feeding enriched with carotenoids normalizes the carotenoid status and reduces oxidative stress in long-term enterally fed patients. Clin Nutr 2006; 25: 897-905.
- Jakobsen LH, et al. Gastrointestinal tolerance and plasma status of carotenoids, EPA and DHA with a fiber-enriched tube feed in hospitalized patients initiated on tube nutrition: Randomized controlled trial. Clin Nutr 2017; 36(2):380-388.
- Van den Braak CC, et al. A novel protein mixture containing vegetable proteins renders enteral nutrition products noncoagulating after in vitro gastric digestion. Clin Nutr 2013; 32(5):765-71.
- Van Eck et al. Plant protein dominant enteral tube feeds are non-coagulating after gastric digestion in contrast to casein dominant enteral tube feeds. ESPEN, 2024 - P862.
- Contrast to Casein dominant enteral tube feeds, ESPEN, 2024 PO62.

 Goelen N, et al. Effect of protein composition of enteral formula on gastric content volume during continuous feeding. A randomized controlled cross-over study in healthy adults. Clin Nutr. 2021;40(5):2663-2672.
- 7. Apport en protéines: consommation, qualité, besoins et recommandations. Rapport de l'AFSSA.2007.
- Guimber D, et al. Effect of multifibre mixture with prebiotic components on bifidobacteria and stool pH in tube-fed children. Br J Nutr 2010; 104: 1514 – 22.
- Schneider SM, et al. Effects of total enteral nutrition supplemented with a multi-fibre mix on faecal shortchain fatty acids and microbiota. Clin Nutr 2006; 25: 82-90.
- Trier E, et al. Effects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. J Pediatr Gastroenterol 1999; 28: 595.
- Silk DBA, et al. The effect of a polymeric enteral formula supplemented with a mixture of six fibres on normal human bowel function and colonic mobility. Clin Nutr 2001; 20:49-58.
- * DHA: acide docosahexaénoïque EPA: acide eicosapentaénoïque. ** 1 L pour Nutrison Concentrated 2.0.
- *** 750 mg pour Nutrition Protein Plus Energy.

Des complexes protéiques spécifiques qui agissent sur la tolérance digestive haute

Des apports en acides aminés supérieurs à ceux recommandés par l'OMS1 et l'ANSES1



Les seules formules avec 4 types complémentaires de protéines (lactosérum, caséines, soja, pois) pour être plus proches d'une alimentation équilibrée telle que préconisée par le PNNS1.



Des mélanges de protéines lentes et rapides formulés pour ne pas coaguler dans l'estomac^{3,4} Protéines lentes Protéines rapides Caséine Lactosérum Soja NUTRICIA Nutrison 1.0 Mélange protéique Reformulé en 2025 NUTRICIA Nutrison Multi Fibre 1.0 Mélange protéique Reformulé en 2025 NUTRICIA Nutrison Mélange protéique initial p4



+ Mélange de fibres mf6°

80 % caséines 20 % lactosérum







* Diamètre (mm)

Comparaison de la coagulation de différentes solutions protidiques (40g/l) après une incubation de 100 minutes dans un système de digestion in vitro4.





^{*} Mélange protéique à dominante végétale pour : Nutrison 1.0, Nutrison MF, Nutrison Energy, Nutrison Energy MF. Mélange p4 à dominante laitière pour Nutrison Protein Plus Energy, Nutrison Protein Plus Energy MF, Nutrison Concentrated 2.0, Nutrison Protein Intense. PDCAAS = 1.

^{1.} ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail/ancien AFSSA). «Apport en protéines : consommation, qualité, besoins et recommandations [Protein intake: dietary

intake, quality, requirements and recommendations].» (2007): 461.

2. Report of a joint FAO/WHO/DNU expert consultation. Protein and amino acid requirements in human nutrition. WHO Technical Report Series 935. (2007): 149-150.

^{3.} Van den Braak CC, et al. A novel protein mixture containing vegetable proteins renders enteral nutrition products noncoagulating after in vitro gastric digestion. Clin Nutr 2013; 3;261;765-71.
4. Van Eck et al. Plant protein dominant enteral tube feeds are non-coagulating after gastric digestion in contrast

to casein dominant enteral tube feeds. ESPEN, 2024 - P862.

Un mélange de fibres pour agir sur la tolérance digestive basse

mf6°: 5 BÉNÉFICES UNIQUES POUR LA NUTRITION ENTÉRALE





 $^{^{\}star}$ Mélange mf6 pour Nutrison Energy MF, Nutrison Protein Plus MF et Nutrison advanced Diason ; Nutrison 10 MF, Nutrison Low Energy MF et le Nutrison advanced Cubison ont un ratio 50 %/50~%.

^{**} Fibres à effet prébiotique. *** Acides Gras à Chaîne Courte.

Guimber D, Bourgeois B, Beghin L, et al. Effect of multifibre mixture with prebiotic components on bifidobacteria and stool pH in tube-fed children. Br J Nutr. 2010;104(10):1514-22

^{2.} Schneider SM, Girard-Pipau F, Anty R, et al. Effects of total enteral nutrition supplemented with a multi-fibre

mix on faecal short-chain fatty acids and microbiota. Clin Nutr. 2006;25(1):82-90

Jakobsen LH, wirth R, Smoliner C, et al. Gastrointestinal tolerance and plasma status of carotenoids, EPA and DHA with a fiber-enriched tube feed in hospitalized patients initiated on tube nutrition: randomized controlled trial. Clin Nutr. 2016

Silk DBA, Walters ER, Duncan HD, et al. The effect of a polymeric enteral formula supplemented with a mixture of six fibres on normal human bowel function and colonic motility. Clin Nutr. 2001;20(1):49-58.



Profil lipidique recommandé pour la population générale¹

Un complexe d'antioxydants végétaux pour réduire significativement le stress oxydatif :



INFO

Acides gras saturés

→ Apport recommandé inférieur à 12 % des AET¹

Acides gras poly-insaturés

- → Apport journalier recommandé en EPA + DHA* de 500 mg¹
- \rightarrow Ratio ω 6 / ω 3 < 5¹

		Lipides (% AET)	AGS** (% AET)	TCM*** (g)	EPA + DHA (mg)	Ratio
	ommandations ournalières¹	35- 40 %	≤ 12 %	-	500	<5
30 mL	Nutrison 1.0	35 %	8,9 %	9,0	504	2,9
Pour 1500 mL	Nutrison Energy	35 %	9,1%	14	507	3,1

- → Origine végétale naturelle
- → Ratios comparables à ceux d'une alimentation classique^{1,2}

Qu'est-ce que le stress oxydatif?


- → Facteur d'inflammation et de mutagénèse³
- → Impliqué dans le développement ou l'aggravation d'affections chroniques et aiguës⁴

Résultats:

Bénéfices prouvés chez les patients en nutrition entérale au long cours :

- Augmentation significative de la teneur sérique en caroténoïdes chez les patients en nutrition entérale au long cours^{5,6}
- > 30 % de réduction des biomarqueurs du stress oxydatif⁵

Réduction significative de l'activation des NF-kB* versus nutrition entérale standard



^{→ 6} principaux caroténoïdes alimentaires à dose physiologique

^{**} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**}AGS : Acides gras saturés.

^{***}TCM : Triglycérides à chaîne moyenne.

AFSSA. Avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l'actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. 2010. Saisine n°2006-SA-0359.

^{*} NF-kB : Bio-marqueur de l'inflammation et du stress oxydatif.

Carroll Y, et al. Is dietary consumption of fruit and vegetables reflected in the plasma carotenoid profiles of older people? Proc Nutr Soc 1998; 57: 3A.

Carroll Y, et al. Carotenoids in young and elderly healthy humans: dietary intakes, biochemical status and diet plasma relationships. Eur J Clin Nutr 1999; 53: 644-53.

^{3.} Favier A, Le stress oxydant. L'actualité chimique, 2003.

Berger MM, Nutritional manipulation of oxidative stress: review of the evidence. Nutr Clin Met 2006; 20(1):48

Vaisman N, et al. Enteral feeding enriched with carotenoids normalizes the carotenoid status and reduces oxidative stress in long-term enterally fed patients. Clin Nutr 2006; 25: 897-905.

Jakobsen LH, et al. Gastrointestinal folerance and plasma status of carotenoids, EPA and DHA with a fiberenriched tube feed in hospitalized patients initiated on tube nutrition: Randomized controlled trial. Clin Nutr. 2016; 36(2): 380-388.

Une bouteille de nutrition entérale majoritairement recyclable conçue pour plus de sécurité et de praticité

NUTRICIA A GAGNÉ 4 PRIX D'INNOVATION POUR SA BOUTEILLE OPTRI











- O Large accroche pour faciliter la suspension de la bouteille
- O Bouteille translucide avec graduations latérales pour aider au suivi de la consommation
- O Capuchon large qui peut s'ouvrir d'une main
- O Bouteille douce au toucher et bordures lisses
- O Tient debout
- O Forme ergonomique pour une bonne prise en main



- O Capuchon solidaire de la bouteille
- O Moins de contact à l'ouverture et à la connexion
- O **Embout en croix** : seules les tubulures de nutrition entérale peuvent être connectées à la bouteille



- O Les bouteilles **se recyclent dans le bac de tri** après avoir enlevé la tubulure
- O Les déchets plastiques issus de la fabrication de la bouteille sont récupérés pour **réintégration dans la chaîne de production**.
- O Par rapport à l'ancien process de production* : 85 % de consommation d'eau et 21 % d'émissions de CO₂ en moins

Le conditionnement en bouteille OpTri est globalement une réussite pour NUTRICIA, compte-tenu de la satisfaction des utilisateurs¹:

66 Questionnaires réalisés auprès patients adultes et enfants, diététicen(ne)s et magasinier(ère)s.

- ✓ Bouteille facile à prendre en main pour le mélange du contenu avant le branchement sur le pied à sérum
- **✓** Trocardage facile
- √ Bonne lisibilité de l'étiquette
- √ Code couleur satisfaisant pour différencier les bouteilles :
 - Hôpitaux : évite les erreurs dans les services
 - Prestataires de santé à domicile : facilite les préparations de colis à livrer aux patients



LE SAVIEZ-VOUS?

NUTRICIA est la première entreprise de nutrition médicale à être certifiée B Corp™ en France

B

Avec B CORP™, nous nous engageons à :

- O Être transparents avec nos parties prenantes internes et externes
- O Faire progresser notre écosystème vers plus de responsabilité
- O Faire évoluer la société vers plus de partage, d'équité et de responsabilité
- O Promouvoir une économie plus régénerative et inclusive

Découvrez tous nos engagements :



^{*} Pour les poches de nutrition entérale

^{1.} Évaluer le nouveau conditionnement de nutrition entérale en bouteille chez les professionnels de santé et les patients à domicile. C. Dabbadie, O. Dronsart, R. Etienne, M. Creste, D. Ferrere, S. Dumery (Diététiciens de la NEAD), M. Cavaye Tanuy (Infirmière) M. Simard, R. Cabrit (Pharmaciens) - Hôpital forcilles fondation Conacq Jay. Poster présenté aux JFN 2020.

Nutrison 1.0

INDICATIONS

→ Besoins énergétiques normaux









SANS LACTOSE

Augmentation du niveau de vitamine D en ligne avec les dernières recommandations de l'ESPEN



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	100 kcal
PROTÉINES	4,0 g (16 % AET)
Azote	0,64 g
LIPIDES	3,9 g (35 % AET)
Acides gras	
Saturés	0,48 g (4,3 % AET)
dont TCM	-
Mono-insaturés	2,1 g
Poly-insaturés	1,3 g
dont EPA - DHA*	33 mg
ω6/ω3	4,3
ω3	221mg
GLUCIDES	12,4 g (49 % AET)
Mono/disaccharides	0,81 g
Polysaccharides	11,2 g
FIBRES	< 0,10 (0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,20 mg
Osmolarité	270 mOsm/L
Eau	85 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	204581	6135853
1000 mL	204590	6135860

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (colza, tournesol), protéines de soja, isolat de protéines de pois, caséinate de sodium (de lait de vache), protéines de lactosérum (de lait de vache), correcteur d'acidité (acide citrique), émulsifiant (lécithine de soja), citrate de potassium, huile de poisson, phosphate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), hydroxyde de magnésium, chlorure de choline, hydroxyde de calcium, L-ascorbate de sodium, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, acétate de rétinol, fluorure de sodium, acétate de DL-α-tocophérol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, D-biotine, molybdate de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Nutrison Multi Fibre

INDICATIONS

→ Besoins énergétiques normaux





SANS LACTOSE

CANC CLUTER







SANS	SANS GLUTEN		
kcal 515	Protéines 20g		
	7,5 ^g		

Augmentation du niveau de vitamine D en ligne avec les dernières recommandations de l'ESPEN



Analyse nutritionnelle ÉNERGIE	Pour 100 mL	
ÉNEDGIE		
LINEKOIL	103 kcal	
PROTÉINES	4,0 g (16 % AET)	
Azote	0,64 g	
LIPIDES	3,9 g (34 % AET)	
Acides gras		
Saturés	0,48 g (4,2 % AET)	
dont TCM	-	
Mono-insaturés	2,1 g	
Poly-insaturés	1,3 g	
dont EPA - DHA*	34 mg	
ω6/ω3	4,3	
ω3	222 mg	
GLUCIDES	12,3 g (48 % AET)	
Mono/disaccharides	0,88 g	
Polysaccharides	11 g	
FIBRES	1,5 g (3 % AET)	
Antioxydants végétaux**	0,20 mg	
Osmolarité	270 mOsm/L	
Eau	84 g	

F	ormat	Code commande	Code LPP
5	00 mL	204584	6135853
10	00 mL	204586	6135860

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (colza, tournesol), protéines de soja, isolat de protéines de pois, caséinate de sodium (de lait de vache), inuline, oligofructose, protéines de lactosérum (de lait de vache), gomme arabique, fibre de soja, correcteur d'acidité (acide citrique), émulsifiant (lécithine de soja), citrate de potassium, huile de poisson, cellulose, hydroxyde de calcium, orthophosphate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), chlorure de choline, amidon résistant, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de magnésium, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, acétate de rétinol, fluorure de sodium, acétate de DL-α-tocophérol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, D-biotine, molybdate de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.

^{*} EPA: acide eicosapentaénoique - DHA: acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

^{1.} Berger MM, et al Clin Nutr. 2022; 41(6):1357-1424.

^{*} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

^{1.} Berger MM, et al Clin Nutr. 2022; 41(6):1357-1424.

Nutrison Energy


INDICATIONS

- → Besoins énergétiques accrus / volume restreint
- Restrictions hydriques: insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques









Augmentation du niveau de vitamine D en ligne avec les dernières recommandations de l'ESPEN



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	150 kcal
PROTÉINES	6,0 g (16 % AET)
Azote	1,0 g
LIPIDES	5,8 g (35 % AET)
Acides gras	
Saturés	0,69 g (4,2 % AET)
dont TCM	-
Mono-insaturés	3,2 g
Poly-insaturés	1,9 g
dont EPA - DHA*	33 mg
ω6/ω3	4,55
ω3	318 mg
GLUCIDES	18,5 g (49 % AET)
Mono/disaccharides	1,2 g
Polysaccharides	16,8 g
FIBRES	< 0,10 (0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,30 mg
Osmolarité	400 mOsm/L
Eau	78 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	204589	6135882
1000 mL	204585	6135899

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (colza, tournesol), protéines de soja, isolat de protéines de pois, caséinate de sodium (de lait de vache), protéines de lactosérum (de lait de vache), citrate de potassium, emulsifiant (lécithine de soja), carbonate de calcium, huile de poisson, chlorure de sodium, orthophosphate de magnésium, citrate de sodium, caroténoides (contient du soja) (β -carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), phosphate de calcium, chlorure de choline, carbonate de magnésium, citrate de calcium, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de potassium, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de Hiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, acétate de rétinol, fluorure de sodium, acétate de DL- α -tocophérol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, outer de potassium, phytoménadione, D-biotine, molybdate de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.

- * EPA : acide eicosapentaénoique DHA : acide docosahexaénoïque.
- ** Caroténoïdes extraits de végétaux.
- 1. Berger MM, et al Clin Nutr. 2022; 41(6):1357-1424.

Nutrison Energy Multi Fibre

INDICATIONS

- → Besoins énergétiques accrus / volume restreint
- → Restrictions hydriques : insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques









SANS GLUTEN			
kcal 765	Protéines 30 g		
	7,5 ⁹		

SANS LACTOSE

Augmentation du niveau de vitamine D en ligne



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	153 kcal
PROTÉINES	6,0 g (16 % AET)
Azote	1,0 g
LIPIDES	5,8 g (34 % AET)
Acides gras	
Saturés	0,7 g (4,1 % AET)
dont TCM	-
Mono-insaturés	3,2 g
Poly-insaturés	1,9 g
dont EPA - DHA*	34 mg
ω6/ω3	4,54
ω3	320 mg
GLUCIDES	18,4 g (48 % AET)
Mono/disaccharides	2,6 g
Polysaccharides	15,4 g
FIBRES	1,5 g (2,0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,30 mg
Osmolarité	480 mOsm/
Eau	76 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	196375	6135882
1000 mL	196327	6135899

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (colza, tournesol), sirop de glucose, protéines de soja, isolat de protéines de pois, caséinate de sodium (de lait de vache), inuline, protéines de lactosérum (de lait de vache), citrate de potassium, oligofructose, émulsifiant (lécithine de soja), gomme arabique, fibre de soja, carbonate de calcium, huile de poisson, cellulose, chlorure de sodium, phosphate de calcium, citrate de sodium, caroténoides (contient du soja) (β-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), orthophosphate de magnésium, carbonate de magnésium, chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de potassium, amidon résistant, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, acétate de rétinol, fluorure de sodium, acétate de DL-α-tocophérol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, D-biotine, molybdate de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.

- * EPA: acide eicosapentaénoique DHA: acide docosahexaénoïque.
- ** Caroténoïdes extraits de végétaux.
- 1. Berger MM, et al Clin Nutr. 2022; 41(6):1357-1424.

Nutrison Protein Plus Energy

INDICATIONS


 Besoins énergétiques et protidiques accrus, hypercatabolisme





SANS LACTOSE







Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	150 kcal
PROTÉINES	7,5 g (20 % AET)
Azote	1,2 g
LIPIDES	5,8 g (35 % AET)
Acides gras	
Saturés	1,5 g (9,1 % AET)
dont TCM	0,90 g
Mono-insaturés	3,2 g
Poly-insaturés	1,1 g
dont EPA - DHA*	51 mg
ω6/ω3	2,8
ω3	248 mg
GLUCIDES	17 g (45 % AET)
Mono/disaccharides	3,3 g
Polysaccharides	13 g
FIBRES	< 0,10 (0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,30 mg
Osmolarité	350 mOsm/L
Eau	77 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	132339	6135913
1000 mL	132396	6135920

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, sirop de glucose, huiles végétales (tournesol, colza, TCM (huile de coco, huile de palmiste)), protéines de lactosérum (de lait de vache), caséinates (de lait de vache), protéines de pois, protéines de soja, émulsifiant (lécithine de soja), huile de poisson, correcteur d'acidité (acide citrique), hydroxyde de potassium, citrate de potassium, phosphate tri-calcique, caroténoides (contient du soja) (β-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), chlorure de potassium, chlorure de choline, hydroxyde de magnésium, carbonate de calcium, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de sodium carbonate de cuivre, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de Di-ca-tocophérol, acétate de rétinol, glucomate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, fluorure de sodium, molybdate de sodium, phytoménadione, cvanocobalamine.

Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

INDICATIONS

→ Besoins énergétiques et protidiques accrus, hypercatabolisme









	0/1110 E	ACTOOL	/
	SANS	GLUTEN	
		D-	
		POUR 500	
4	kcal	Protéines	

SANSTACTOSE





Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	153 kcal
PROTÉINES	7,5 g (20 % AET)
Azote	1,2 g
LIPIDES	5,8 g (34 % AET)
Acides gras	
Saturés	1,5 g (8,8 % AET)
dont TCM	0,90 g
Mono-insaturés	3,2 g
Poly-insaturés	1,0 g
dont EPA - DHA*	51 mg
ω6/ω3	2,8
ω3	242 mg
GLUCIDES	17 g (44 % AET)
Mono/disaccharides	5,7 g
Polysaccharides	11 g
FIBRES	1,5 g (2,0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,30 mg
Osmolarité	390 mOsm/L
Eau	76 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	132371	6135913
1000 mL	132395	6135920

INGRÉDIENTS

Eau, sirop de glucose, dextrine-maltose, huiles végétales (tournesol, colza, TCM (huile de coco, huile de palmistel), protéines de lactosérum (de **lait** de vache), caséinates (de **lait** de vache), fibres alimentaires (inuline, oligofructose, gomme arabique, polysaccharides de **soja**, cellulose, amidon résistant), protéines de **soja**, protéines de poisson, hydroxyde de potassium, cirtate de potassium, carbonate de calcium, caroténoïdes (contient du **soja**) (β -carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), chlorure de choline, chlorure de potassium, correcteur d'acidité (acide citrique), L-ascorbate de sodium, hydroxyde de magnésium, lactate ferreux, sulfate de zinc, acétate de rétind, acétate de DL- α -tocophérol, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, chlorure de chrome, fluorure de sodium, chlorhydrate de thiamine, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, molybdate de sodium, phytoménadione, cyanocobalamine.

^{*} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

^{*} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

LA SEULE GAMME CONCENTRÉE 2 kcal/mL NORMOPROTIDIOUE*

Nutrison Concentrated 2.0


INDICATIONS

- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux / Volume restreint
- → Restrictions hydriques : insuffisances rénales, hépatiques, cardiagues









SANS LACTOSE



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	200 kcal
PROTÉINES	7,5 g (15 % AET)
Azote	1,2 g
LIPIDES	10 g (45 % AET)
Acides gras	
Saturés	2,5 g (11 % AET)
dont TCM	1,7 g
Mono-insaturés	5,8 g
Poly-insaturés	1,7 g
dont EPA - DHA*	50 mg
ω6/ω3	2,9
ω3	381 mg
GLUCIDES	20,1 g (40 % AET)
Mono/disaccharides	1,3 g
Polysaccharides	19 g
FIBRES	< 0,10 g (0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,40 mg
Osmolarité	410 mOsm/L
Eau	70 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	132387	1129109

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (tournesol, colza, TCM (huile de coco, huile de palmiste)), protéines de lactosérum (de lait de vache), caséinates (de lait de vache), protéines de pois, protéines de soja, citrate de potassium, huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), hydroxyde de potassium, carbonate de calcium, chlorure de magnésium, citrate de sodium, caroténoides (contient du soja) (β -carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), chlorure de choline, correcteur d'acidité (acide citrique), orthophosphate de magnésium, 1-ascorbate de sodium, hydroxyde de magnésium, lactate ferreux, chlorure de potassium, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de rétinol, acétate de DL- α -tocophérol, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, cholécalciférol, D-pantothénate de calcium, D-biotine, chlorure de chrome, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, molybdate de sodium, fluorure de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, cyano-chalamine

Nutrison Concentrated 2.0 Multi Fibre

INDICATIONS

- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux / Volume restreint
- → Patients en oncologie / neurologie / insuffisance cardiaque-hépatique / postopératoire







SANS GLUTEN	
1000	Protéines 37,5°
	7,5

SANS LACTOSE



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	200 kcal
PROTÉINES	7,5 g (15 % AET)
Azote	1,2 g
LIPIDES	9,7 g (44 % AET)
Acides gras	
Saturés	2,5 g (11 % AET)
dont TCM	1,6 g
Mono-insaturés	5,5 g
Poly-insaturés	1,6 g
dont EPA - DHA*	87,3 mg
ω6/ω3	2,65
ω3	381 mg
GLUCIDES	20,1 g (40 % AET)
Mono/disaccharides	1,4 g
Polysaccharides	18,2 g
FIBRES	1,5 g (1 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,40 mg
Osmolarité	520 mOsm/L
Eau	70 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	184293	1188276

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (tournesol, colza, TCM (huile de coco, huile de palme)), protéines de lactosérum (de lait de vache), caséinate de sodium (de lait de vache), protéines de soja, isolat de protéines de pois, inuline, oligofructose, huile de poisson, gomme arabique, citrate de potassium, fibre de soja, citrate de sodium, phosphate tricalcique, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de potassium, carbonate de calcium, correcteur d'acidité (acide citrique), cellulose, caroténoïdes (soja) (β -carotène (soja), oléorésine de lycopène de tornate, lutéine (soja), chlorure de choline, orthophosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de magnésium, t-ascorbate de sodium, amidon résistant, taurine, L-carnitine, orthophosphate di-potassique, lactate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acétate de DL- α -tocophérol, chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, fluorure de sodium, nicotinamide, préparanes de sodium, selénite de sodium, selénite de sodium, selénite de sodium, b-biotine, phytoménadione, choléealciférol, cyanocobalamine.

^{*} EPA: acide eicosapentaénoique - DHA: acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

^{*} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre

- Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre est une formule de nutrition entérale concentrée, hyperprotidique et hypergénétique, et contenant des fibres alimentaires.
- > Formule nutritionnellement complète. Convient comme seule source d'alimentation.
- → Mélange protéique de haute qualité : protéines de soja et de pois, PDCASS = 1. Ce mélange répond au profil en acides aminés de référence recommandé par la FAO* pour les adultes1.
- → Convient aux patients ayant un régime végétalien.
- → Mélange de fibres mf6[™] support de la tolérance digestive basse : Association de 6 fibres, solubles (80 %) et insolubles (20 %). Activité prébiotique^{2,3} et transit régulé⁴⁻⁶.

Une étude clinique réalisée avec Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre a démontré7:

28 jours (n = 41)


• Une très bonne tolérance gastro-intestinale :

70 % des patients ont déclaré n'avoir aucun symptôme qastro-intestinal° avec Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre



• Une très bonne observance :

Référence 97 % d'adéquation entre la prescription et la prise



- * FAO: Food and Agriculture Organisation.
- ° (diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, ballonnements, flatulences, éructations).
- 1. Food Agriculture Organization of the United Nations. Dietary Protein Quality Evaluation in Human Nutrition: Report of an FAO Expert Consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2013.
- 2. Guimber D. et al. E effect of multifibre mixture with prebiotic components on bifidobacteria and stool pH in tube-fed children. Br J Nutr 2010; 104: 1514 - 22.
- 3. Schneider SM, et al. Effects of total enteral nutrition supplemented with a multi-fibre mix on faecal short-chain fatty acids and microbiota. Clin Nutr 2006; 25: 82-90.
- 4. Trier E, et al. E ects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J Pediatric Gastroenterol 1999; 28: 595.
- 5. Silk DBA, et al. The effect of a polymeric enteral formula supplemented with a mixture of six fibres on normal human bowel function and colonic mobility. Clin Nutr 2001;20:49-58.
- 6. Jakobsen LH, et al. Gastrointestinal tolerance and plasma status of carotenoids, EPA and DHA with a fiber-enriched tube feed in hospitalized patients initiated on tube nutrition: Randomized controlled trial. Clin Nutr 2017; 36(2):380-388.
- 7. ACBS trial. Griffen C, et al. Abstract no. LB28-W. Presented at ESPEN Congress Lyon, 11-14th of September 2023.

INDICATIONS

- Besoins énergétiques et protidiques accrus / Volume restreint
- → Restriction hydrique





SANS LACTOSE



SANS	BLUIEN
	POUR 500 3,
	00
kcal	Protéines 2





Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	200 kcal
PROTÉINES	10 g (20 % AET)
Azote	1,6 g
LIPIDES	9,3 g (42 % AET)
Acides gras	
Saturés	2,2 g (9 %AET)
dont TCM	1,4 g
Mono-insaturés	5,1 g
Poly-insaturés	2,0 g
dont EPA - DHA*	89,9 mg
ω6/ω3	3,18
ω3	425 mg
GLUCIDES	18,5 g (37 % AET)
Mono/disaccharides	1,3 g
Polysaccharides	16,8 g
FIBRES	1,5 g (1 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,40 mg
Osmolarité	540 mOsm/L
Eau	70 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	197438	1167736

Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, triglycérides à chaîne moyenne (huile de coco et de palme), protéines de soja (5.68 %), isolat de protéines de pois (5.08 %), inuline, émulsifiant (lécithine de soja), oligofructose, chlorure de potassium, gomme arabique, fibre de soja, huile riche en DHA et EPA de microalgue schizochytrium sp., citrate de potassium, chlorure de magnésium, citrate de calcium, carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium), hydroxyde de potassium, cellulose, correcteur d'acidité (acide citrique), caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), chlorure de choline, hydroxyde de calcium, orthophosphate de magnésium, L-ascorbate de sodium, amidon résistant, taurine, L-carnitine, citrate de magnésium, chlorure de sodium, sulfate de zinc, lactate ferreux, acétate de $DL-\alpha$ -tocophérol, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, fluorure de sodium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, sulfate de manganèse, acide ptéroylmonoglutamique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Il est recommandé d'utiliser une pompe et/ou une seringue pour une utilisation optimale du produit. L'alimentation par gravité n'est pas recommandée en raison du débit plus faible.

^{*} EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque.

^{**} Caroténoïdes extraits de végétaux.

Nutrison Advanced Peptisorb

INDICATIONS

- → Besoins spécifiques : malabsorption
- → Formule semi-élémentaire (100 % de protéines de lactosérum hydrolisées et 50 % de lipides sous forme de TCM) pour faciliter l'absorbtion en cas de malabsorption/maldigestion.



- 100% protéines de lactosérum hydrolysées
- 50% de TCM









Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	100 kcal
PROTÉINES	4,0 g (16 % AET
Azote	0,64 g
LIPIDES	1,7 g (15 % AET)
Acides gras	
Saturés	0,99 g (8,9 % AET
dont TCM	0,83 g
Mono-insaturés	0,20 g
Poly-insaturés	0,49 g
dont EPA - DHA*	-
ω6/ω3	8,3
ω3	50 mg
GLUCIDES	18 g (69 % AET)
Mono/disaccharides	1,1 g
Polysaccharides	15 g
FIBRES	0 (0 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,16 mg
Osmolarité	455 mOsm/L
Eau	84 g

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	132218	Non remboursé

Eau déminéralisée, dextrine-maltose, hydrolysat de lactosérum (de lait de vache), amidon (maïs), correcteur d'acidité (acide citrique), huiles végétales (soja, TCM (huile de coco, huile de palme)), citrate de potassium, citrate de sodium, orthophosphate de calcium, chlorure de magnésium, orthophosphate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de choline, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), L-ascorbate de sodium, taurine, lactate ferreux, sulfate de zinc, acétate de $DL-\alpha$ -tocophérol, gluconate de cuivre, nicotinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, fluorure de sodium, riboflavine, acétate de rétinol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, molybdate de sodium, cholécalciférol.

- * EPA : acide eicosapentaénoique DHA : acide docosahexaénoïque.
- ** Caroténoïdes extraits de végétaux.

Nutrison Peptisorb Plus HEHP

INDICATIONS

- → Besoins spécifiques : malabsorption
- → Formule semi-élémentaire (100 % de protéines de lactosérum hydrolisées et 60 % de lipides sous forme de TCM) pour faciliter l'absorbtion en cas de malabsorption/maldigestion.
- → Une étude¹ a montré l'augmentation de l'apport énergétique et protéique, la réduction de l'incidence et de l'intensité des diarrhées. l'amélioration de l'observance et la bonne tolérance digestive.
- → Produit hyperénergétique, hyperprotidique.

• 100 % protéines de lactosérum hydrolysées

• 60 % de TCM





Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL	
ÉNERGIE	150 kcal	
PROTÉINES	7,5 g (20 % AET)	
Azote	1,2 g	
LIPIDES	5,0 g (30 % AET	
Acides gras		
Saturés	3,6 g (21,6 % AET)	
dont TCM	3,0 g	
Mono-insaturés	0,62 g	
Poly-insaturés	0,83 g	
dont EPA - DHA*	0,6 mg	
ω6/ω3	5,16	
ω3	98,75 mg	
GLUCIDES	17,5 g (50 % AET	
Mono/disaccharides	1,4 g	
Polysaccharides	17 g	
FIBRES	< 0,5 g (0 % AET	
Antioxydants végétaux**	0,30 mg	
Osmolarité	445 mOsm/L	
Eau	77 g	


Format	Code commande	Code LPP
500 mL	173942	1119559

Eau, dextrine-maltose, hydrolysat de protéines de lactosérum (de lait de vache), huiles végétales (TCM (coco, palme), colza), lécithine de soia, stabilisants (cellulose microcristaline, carboxyméthylcellulose de sodium), citrate de sodium, hydroxyde de potassium, orthophosphate de magnésium, phosphate de calcium, chlorure de choline, chlorure de sodium, L-ascorbate de sodium, taurine, L-carmitine, lactate ferreux, citrate de magnésium, sulfate de zinc, caroténoïdes (contient du soia) (oléorésine de lycopène de tomate, β-carotène, lutéine), acétate de DL-α-tocophérol, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, fluorure de sodium, riboflavine, acétate de rétinol, nicotinamide, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, molybdate de sodium, cholécalciférol.

* EPA : acide eicosapentaénoique - DHA : acide docosahexaénoïque. ** Caroténoïdes extraits de végétaux. 1. Green B, et al., Complex enterally tubefed community patients display stable tolerance, improved compliance and better achieve energy and protein targets with a high-energy, high-protein peptide-based enteral tube feed: Results from a multi-centre pilot study. Nutrients. 2020;12(11):1-16.

Nutrison Advanced Cubison

Cubison est la seule formule de nutrition entérale enrichie en arginine, en zinc et en micronutriments ayant des propriétés antioxydantes (Se, Vit C, Vit E).




La cicatrisation des escarres semble plus rapide lorsqu'une formule de nutrition enrichie en protéines, arginine, zinc et vitamine C est administrée, la rendant préférable à une formule standard.8

Les données présentées ici nécessitent d'être confirmées par une étude

de qualité, randomisée et contrôlée, conduite à plus grande échelle.

Pourcentage de réduction de la surface de l'escarre : différence significative entre le groupe traité et le groupe torrôle à 8 et 12 semaines (respectivement *p < 0,00 et **p < 0,005).



- 1. Mayer NA, et al. Nutrient support of the healing wound. New Horiz; 1994:2 (2): 202-214.
- 2. Harris CL, et al. Malnutrition in the institutionalized elderly: the effects on wound healing. Ostomy Wound Manage; 2004:50 (10): 54-63.
- 3. Scholl D, et al. Nutrient recommendations for wound healing. J Intraven Nurs; 2001:24 (2): 124-132.
- 4. Barbul A, et al. Arginine enhances wound healing and lymphocyte immune responses in humans. Surgery; 1990:108 (2): 331-336.
- 5. Kirk SJ, et al. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human beings. Surgery, 1993.114: 155-160.
- 6. Thompson C, et al. Nutrients and wound healing: still searching for the magic bullet. Nutr Clin Pract; 2005:20 (3): 331-347.
- 7. Patel GK, et al. The role of nutrition in the management of lower extremity wounds. Int J Low Extrem Wounds; 2005:4 (1): 12-22.
- Cereda E, et al. Disease-specific, versus standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc, 2009;57(B):1395-402.

INDICATIONS

→ Besoins spécifiques : cicatrisation des escarres









Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL
ÉNERGIE	104 kcal
PROTÉINES	5,5 g (22 % AET)
Azote	1,0 g
Arginine totale	0,85 g
LIPIDES	3,3 g (28 % AET)
Acides gras	
Saturés	1,2 g (10 % AET)
dont TCM	0,90 g
Mono-insaturés	1,4 g
Poly-insaturés	0,70 g
dont EPA - DHA*	-
ω6/ω3	5,3
ω3	107 mg
GLUCIDES	13 g (47 % AET)
Mono/disaccharides	1,0 g
Polysaccharides	11 g
FIBRES	1,5 g (2,9 % AET)
Antioxydants végétaux**	0,25 mg
Osmolarité	315 mOsm/L
Eau	83 g

Format	Code commande	Code LPP
1000 mL	132205	Non remboursé

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, caséinates (de **lait** de vache), huiles végétales (colza, tournesol, TCM (huile de coco, huile de palmistel), fibres alimentaires (polysaccharides de **soja**, amidon résistant, inuline, gomme arabique, cellulose, oligo-fructose), L-arginine, correcteur d'acidité (acide citrique), émulsifiant (lécithine de **soja**), citrate de potassium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, L-ascorbate de sodium, caroténoïdes (contient du **soja**) (β-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), citrate de sodium, orthophosphate de magnésium, phosphate thri-calicique, chlorure de choline, orthophosphate di-potassique, hydroxyde de calcium, hydroxyde de magnésium, acitate de DL-α-tocophérol, hydroxyde de potassium, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, fluorure de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, chlorure de chrome, molybdate de sodium,

- * EPA : acide eicosapentaénoique DHA : acide docosahexaénoïque.
- ** Caroténoïdes extraits de végétaux.

Nutrison Protein Intense

→ Une formule de nutrition entérale hyperprotidique aux protéines entières qui s'inscrit dans les recommandations internationales de réanimation¹-²

EN RÉANIMATION:

- → Quand une nutrition artificielle est nécessaire, la nutrition entérale est le support nutritionnel à privilégier^{2,3,4}.
- → Le patient agressé peut perdre plus de 1 % de sa masse maigre par jour soit 1,5-3 kg de muscle par semaine⁵⁶.
- → Une étude a montré que Nutrison Protein Intense permet d'atteindre la cible protéique de 1,3 g/kg/jour recommandée par l'ESPEN⁷.

INDICATIONS

→ Nutrison® Protein Intense est particulièrement adapté pour la prise en charge nutritionnelle des patients dénutris en soins intensifs, ayant des besoins protidiques accrus.





SANS LACTOSE
SANS GLUTEN



	_
	Protéines 3
630	Protéines 32 50 g
000	Fibres
	0,45 ⁹



Analyse nutritionnelle	Pour 100 mL	
ÉNERGIE	126 kcal	
PROTÉINES	10 g (32 % AET)	
Azote	1,6 g	
LIPIDES	4,9 g (35 % AET)	
Acides gras		
Saturés	1,3 g (9,4 % AET)	
dont TCM	0,69 g	
Mono-insaturés	2,6 g	
Poly-insaturés	0,96 g	
dont EPA - DHA*	51 mg	
ω6/ω3	2,9	
ω3	221 mg	
GLUCIDES	10 g (33 % AET)	
Mono/disaccharides	0,80 g	
Polysaccharides	9,3 g	
FIBRES	0,09 (0 % AET)	
Antioxydants végétaux**	0,20 mg	
Osmolarité	275 mOsm/L	
Eau	81 g	

Format	Code commande	Code LPP
500 mL	141425	Non remboursé

- * EPA : acide eicosapentaénoique DHA : acide docosahexaénoïque.
- ** Caroténoïdes extraits de végétaux.
- Sioson MS, Martindale R, Abayadeera A, et al. Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions: A consensus statement. Clin Nutr ESPEN. 2018;24:156-164.
- Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2018;xxx1-32 (article in press).
- LEFRANT et al. Nutrition artificielle en réanimation-Guidelines for nutrition support in critically ill patient: Société Française d'Anesthésie et de Réanimation. 2014.
- 4. Fairpont V. et al. In : Questions de nutrition clinique en réanimation et soins intensifs. Les Editions de la SFNEP « Nourrir l'homme Malade ». 2010; 69-82.
- Plank et al. Sequential changes in the metabolic response in severely septic patients during the first 23 days after the onset of peritonitis annals of surgery. 228(2):146-158, august 1998.
- 6. QNC en réanimation et soins intensifs, 2010.
- Van Zanten ARH, Petit L, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides protein intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized rial. Critical Care. 2018; 22:156-67.

INGRÉDIENTS

Eau, dextrine-maltose, protéines de lactosérum (de lait de vache), huiles végétales (tournesol, colza, TCM (huile de coco, huile de palmiste)), caséinate de sodium (de lait de vache), isolat de protéines de pois, protéines de soja, correcteur d'acidité (acide citrique), huile de poisson, émulsifiant (léctifine de soja), hydroxyde de potassium, chlorure de potassium, hydroxyde de calcium, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), chlorure de choline, citrate de sodium, hydroxyde de magnésium, L-ascorbate de sodium, lactate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, acétate de DL-α-tocophérol, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, fluorure de sodium, acétate de rétinol, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, D-biotine, molybdate de sodium, sélénite de sodium, phytoménadione, cholécalciférol.



POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE FLOCARE® INFINITY™III

INTUITIVE & PERSONNALISABLE

POMPE FLOCARE® INFINITY™ III

- Pompe péristaltique à galets contrôlée par microprocesseur pour usage ambulatoire ou fixe
- Dispositif médical de classe IIa
- Marquage CE 0344
- Conditionnement x 1
- Référence : 121825



- ✓ Boutons intuitifs & grand écran couleur
- 3 modes de nutrition et jusqu'à
- 3 programmes personnalisés
- ✓ Historique de 30 jours détaillé
- Programmable en 18 langues
- V Petite & légère, facile à transporter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taille: 154 x 120 x 49 mm
- Poids: 432 a
- Batterie rechargeable Lithium Ion
- Autonomie: ~24 h à125 mL/h, 12 h à 250mL/h, pour une batterie neuve
- Jusqu'à 3 programmes de nutrition personnalisés pré-enregistrables
- Plage volume: 1 3500 mL par pallier de 1 mL
- Plage débit: 1 600 mL/h par pallier de 1 mL/h
- Alarmes et sécurité
- Fonctionne dans toutes les positions
- Écran LCD couleur, 2,8 couleurs ; 640 x 480 px ; 175 degrés, angle de vision
- Étanche IP25 nettoyage possible à l'eau claire sous le robinet

Lire la notice d'instruction avant utilisation.

NUTRICIA VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES SERVICES SUR MESURE

Rendez-vous sur danonesantenutrition.com, page produit "Flocare® Infinity™ III"





VIDÉOS TUTORIELS D'UTILISATION









Tubulures de nutrition entérale Flocare® Infinity™ (conditionnement x30)

Type de tubulure	Référence
ENPlus* avec chambre compte-gouttes	86514
ENPlus* sans chambre compte-gouttes	100103
ENPlus* double voie sans chambre compte-gouttes	86518
Universelle sans chambre compte-gouttes	90084



Sondes naso-gastriques

(conditionnement x10)

Charrière	Longueur	Référence
Ch. 6	60 cm	94567
Ch. 8	110 cm	94569
Ch. 10	110 cm	94570
Ch. 12	110 cm	94571
Ch. 14	110 cm	94572



Sondes naso-jéjunales de Benmark®

cond	ition	nem	ent	x3)	

Charrière	Longueur	Référence
Ch. 8	145 cm	94824
Ch. 10	145 cm	94825



Kit pour Gastrostomie percutanée Endoscopique Flocare® (GPE)

(conditionnement x10)

(
Charrière	Longueur	Référence		
Ch. 10	40 cm	94820		
Ch. 14	40 cm	94821		
Ch. 18	40 cm	94822		



Sonde de gastrostomie à ballonnet Flocare® (conditionnement x10)

GI II	Couleur	Longueur			
Charrière	de la valve	Totale	Connecteur Ballonnet	Référence	
Ch. 10	Blanche	25 cm	16 cm	94814	
Ch. 14	Verte	25 cm	16 cm	94815	
Ch. 16	Orange	25 cm	16 cm	94816	
Ch. 18	Rouge	25 cm	16 cm	94817	
Ch. 20	Jaune	26 cm	17 cm	94818	





Demandez la brochure détaillée sur la gamme de dispositifs médicaux Flocare

DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS ET VOS PATIENTS, DE L'HÔPITAL AU DOMICILE

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DES FORMATIONS

Sur site

- Dénutrition de l'adulte : du dépistage à la prise en charge
- Bonnes pratiques de nutrition entérale
- Nutrition entérale : Des réticences à l'alliance thérapeutique
- Dénutrition et escarres
- Formation aux études cliniques

Hors site

- Formations annuelles validées par des comités scientifiques constitués d'experts
- Cours Supérieur de Nutrition Artificielle (CSNA)
- Entretiens de Nutrition Clinique (ENC)







Participation Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PH-RC)

• Des études cliniques en collaboration avec des experts et en apportant son soutien à des PHRC : Étude NEPHA

Webinaires en directs ou en replay

Plateforme de formation en ligne Flocare® Infinity III

DES OUTILS PRATIQUES D'AIDE À LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DE VOS PATIENTS

- Abrégé de Nutrition Entérale pratique à l'usage du praticien hospitalier et du personnel soignant,
- Brochures sur les produits,
- · Cas cliniques,
- Éventail d'aide à la prescription,
- Kit pose de sonde : Fiches éducatives
- Disque HyCoNe : Déterminer le volume d'hydratation complémentaire



DES SITES INTERNET DÉDIÉS

www.danonesantenutrition.com nutrition-et-oncologie.fr



PATIENTS ET AIDANTS

OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE RETOUR À DOMICILE

• Livret de retour à domicile



DES PRODUITS POUR LEUR QUOTIDIEN

- Mallettes de maintenance,
- · Sacs à dos.
- Supports et cadres de maintien





DES SITES INTERNET QUI ACCOMPAGNENT VOS PATIENTS LORS DU RETOUR À DOMICILE

enteraledomicile.fr

- Du contenu informatif pour mieux vivre sa nutrition entérale au quotidien.
- Des témoignages de patients, de familles et de professionnels de santé.
- Un espace polyhandicap avec des vidéos d'explication et d'accompagnement.
- Un espace pédagogique pour les enfants et les parents avec des BDs, des livrets de jeux, des trucs et astuces...



manger-pour-mieux-me-soigner.fr

 Des conseils, astuces et recettes pour aider les patients en oncologie à mieux s'alimenter



Les produits Nutrison sont des DADFMS*.

Formule		Code commande	Code LPP**
Nutrison ⁻	1.0		
Ctanda:l	500 ml	204581	6135853
Standard	1 000 ml	204590	6135860
Model Elem	500 ml	204584	6135853
Multi Fibre	1 000 ml	204586	6135860
Nutrison	Energy		
	500 ml	204589	6135882
Standard	1 000 ml	204585	6135899
M. In Ed	500 ml	196375	6135882
Multi Fibre	1 000 ml	196327	6135899
Nutrison	Protein Plus	Energy	
Standard	500 ml	132339	6135913
Starioaro	1 000 ml	132396	6135920
Multi Fibre	500 ml	132371	6135913
	1 000 ml	132395	6135920
Nutrison (Concentrate	d 2.0	
Standard	500 ml	132387	1129109
Multi Fibre	500 ml	184293	1188276
Nutrison	PlantBased :	2 kcal HP Multi Fibr	e
Multi Fibre	500 ml	197438	1167736
Nutrison A	Advanced Cu	ıbison	
	1 000 ml	132205	Non remboursé
Nutrison A	Advanced Pe	eptisorb	
	500 ml	132218	Non remboursé
Nutrison	Peptisorb Pl		
	500 ml	173942	1119559

141425

Non remboursé

UN SERVICE CLIENT AU PLUS PROCHE DE VOUS

Numéro de téléphone unique 01 49 48 47 00



ADRESSES MAIL PAR RÉGION

Région Nord	clients.bledinanutricia.nord@danone.com
Région Ile-de-France	clients.bledinanutricia.idf@danone.com
Région Ouest	clients.bledinanutricia.ouest@danone.com
Région Est	clients.bledinanutricia.est@danone.com
Région Sud	clients.bledinanutricia.sud@danone.com
DOM-COM	export@nutricia.com

Site internet

www.danonesantenutrition.com

Site internet dédié aux patients et à leur entourage enteraledomicile.fr

Nutrison Protein Intense

^{*} DADFMS: Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical.
** LPP: Liste des produits et prestations remboursables - Arrêté du 9 novembre 2009 - JO du 17 novembre 2009 - Arrêté du 10 juin 2022 - JO du 15 juin 2022 - Arrêté du 8 juin 2023 - JO du 13 juin 2023 - Arrêté du 3 avril 2024 - JO du 5 avril 2024.



Services et informations Tél.: 01 49 48 47 00

Service après-vente Flocare Infinity Tél.: 04 91 44 15 92 Fax: 04 91 44 15 47 Mail: savnutricia@a-m-m.fr

Sites internet

www.danonesantenutrition.com enteraledomicile.fr

NUTRICIA Nutrition Clinique 17/19 rue des deux gares, CS 50149 92565 Rueil-Malmaison Cedex





